

TOURNIQUET – PNEUMATISCHE BLUTSPERRE

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmus

Indikationen / Symptome:

- lebensbedrohliche Blutung an einer Extremität
- Blutstillung durch andere Maßnahmen nicht zu erreichen

JA

Durchführung:

- Anlage der Sperre 5-10cm proximal (körpernah) der Blutungsquelle (wenn möglich)
 - Cave: nicht in Höhe Fibulaköpfchen!
 - Nicht auf Kleidung anlegen (Verrutschen)
- Knebel/Sperre bis zur kompletten Blutstillung anziehen und fixieren (Cave: Venöse Stauung bei inkompletter Sperre!)
- Uhrzeit der Anlage auf/an der Sperre notieren
- Analgesie bei Schmerzen

Algorithmus Starke Schmerzen - Esketamin

Erfolgsprüfung

- Sistieren der Blutung

Maßnahme erfolgreich?

NEIN

GEGENMAßNAHMEN bei Ineffektivität:

- ggf. 2. Tourniquet proximal des Ersten
- ggf. zusätzliche alternative Maßnahmen wie Druckverband, manuelle Kompression

JA

Verlaufskontrolle:

- regelmäßige Kontrolle der Blutstillung in kurzen Abständen
- Dokumentation (Zeit der Tourniquet-Anlage!)

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport