ANAPHYLAXIE - KIND

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmen
Verwenden Sie kognitive Hilfsmittel (z.B. Kindernotfall-Lineal, oder -APP)

Akuter Beginn? Allergie bekannt?

Stadium I

KEIN i.v.-Zugang im Stadium I

Gabe von 100 mg Prednisolut rektal

Stadium II + III:

O_2-Gabe 15 l/min, Lagerung nach Kreislauf

Adrenalin 1 : 1000 i.m. in den Oberschenkel
Kinder > 12 J.: 0,5 mg
Kinder 6 – 12 J.: 0,3 mg
Kinder < 6 J.: 0,15 mg

Bei Stridor:
4 mg Adrenalin pur
mit O_2 vernebeln

i.v.-Zugang und 10 ml/kg KG kristalloide Infusionslösung

Kontinuierliches Monitoring: AF, HF, EKG, SpO_2, Blutdruck

Einmalgabe i.v.:
Kinder > 30 kg: 250 mg Prednisolon + 4,0 mg Dimetinden
Kinder 15-30 kg: 100 mg Prednisolon + 2,0 mg Dimetinden
Kinder < 15 kg: 50 mg Prednisolon + 1,0 mg Dimetinden

Wenn nach 5 min keine Besserung:
Wiederholung Adrenalin i.m. alle 5 min
Bei Hypotonie wiederholte Volumengabe

Stadium IV

CPR lt. ERC

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport