VERBRENNUNGEN

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmen

Beachte: Leitalgorithmus Trauma

Beachte: Basisalgorithmus Starke Schmerzzustände

Inhalationstrauma?

JA

O₂-Gabe, Oberkörperhochlagerung, Vernebelung von 5 mg Adrenalin, CPAP indiziert?

NEIN

Ausmaß einschätzen (9er-Regel) Prozent Körperoberfläche Verbrennungsgrad

Kriterien für Verbrennungszentrum


Transportorganisation einleiten (z. B. RTH in Verbrennungszentrum)

Wärmeerhalt! keine Kühlung


Infusion: Kristalloide max. 10 ml/kgKG/h

Wundversorgung

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport in nächstgelegenes geeignetes Krankenhaus









KRITERIEN FÜR VERBRENNUNGSZENTRUM Bei Erwachsenen:

- mehr als 20% 2° verbrannter KOF
- mehr als 10% 3° verbrannter KOF
 Verbrennungen an Gesicht/Hals, Händen, Füßen, Anogenital-Region oder sonstiger komplizierter Region
- Inhalationsschaden
- mechanische Begleitverletzungen
- elektrische Verletzungen
- Vorerkrankungen oder Alter unter 8 Jahre bzw. über 60 Jahre

Bei Kindern

- Alter < 1 Jahr
- 2a° mit mehr als 5% KOF
- 2b° und 3° mit mehr als 1% KOF
- Inhalationstrauma
- Trauma durch chemische Noxen
- elektrische Verletzungen