

ANLAGE B2B - ÜBERSICHT DER DOSIERUNGSTABELLEN AUS DEN VERFAHRENSANWEISUNGEN

30 – Krampfanfall Kinder > 30 kg – Midazolam

| Körpergewicht | 3 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ml | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |

Dosierungstabelle Midazolam (Menge mit 0,1 ml zusätzlich für Totraum MAD berechnet, gerundet und altersangepasst)

36 - Starke Schmerzzustände Erwachsene und Kinder > 30 kg – Esketamin

| Körpergewicht | kg | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,2 mg/kg/KG | mg | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Esketamin i.v. 5 mg/ml | ml | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 |

Die Tabelle bezieht sich auf die Verdünnungsempfehlung in Anlage B2.

37 – Starke Schmerzzustände Kinder < 30 kg - Esketamin

| Körpergewicht | kg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| i.v. | mg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,2 mg/kg/KG | ml | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| i.m. | mg | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
| 0,5 mg/kg/KG | ml | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| i.n./MAD | mg | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 1 mg/kg/KG | ml | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |

Die Tabelle bezieht sich auf die Verdünnungsempfehlung in Anlage B2.

38 – Starke Schmerzzustände – Morphin

| Körpergewicht | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| mg | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Dosierungstabelle Morphin (verdünnt i.v.) bezogen auf die Verdünnungsempfehlung in Anlage B